



Red Fitosanitaria de Aragón

Informe sobre la situación fitosanitaria - Semana 38

Olivar

Fenología

El estado fenológico, en esta semana en algunas zonas se ha iniciado ya el cambio de coloración de los frutos.

Semana	Zona			
		H. Endurecimiento de hueso.	I. Inicio de envero.	Z. Recolección
38	Matarraña		100%	
	Bajo Aragón	100%		
	Caspe	20%	60%	20%
	Somontano	40%	60%	
	Valdejalón-Borja	100		
	Belchite	100		

Plagas

MOSCA DEL OLIVO *Bactrocera oleae*

Las capturas registradas en los puntos del Matarraña son diversas ya que van de 0.72 a 7386 moscas por trampa y día. En esta zona los daños han sido igualmente desiguales, no correspondiendo siempre los mayores daños con las mayores capturas, estas afecciones se encuentran entre 0 y 17.6 % de los frutos. En el punto con mayor afección la mayoría de las

Informe sobre la situación Fitosanitaria. Semana 38/2021

picadas están en los estadios huevo y L1, sin embargo, un gran número de picadas no han evolucionado. Sin embargo, el otro punto con afección de 10% de los frutos la mayoría se encuentran entre pupa y pupario, aunque también tiene en estado L1 y muchas picadas muertas.

De igual forma en la zona del Bajo Aragón de Teruel, las capturas han sido diversas de 1.65 a 12.87 adultos por trampa y día. Los frutos dañados son menores que en Matarraña, entre 0 y 8.27% de frutos afectados, sin ser tampoco en este caso proporcionales a las capturas de cada punto. En general se encuentran mucha picada muerta, es menor que en anteriores semanas. Las vivas, de forma generalizada se encuentran en los primeros estadios, huevo y L1, aunque también se localizan algunas pupas y puparios.

En la zona de Caspe, las capturas esta semana son bajas, tan solo en uno de los puntos se ha contabilizado más de 4 moscas por trampa y día. Los daños en fruto apenas alcanzan el 2% de estos, en el peor de los casos. Además, muchas de las picadas no han podido desarrollarse.

En Barbastro, sigue una tendencia parecida, con capturas entre 0.9 y 4.1 mosca al día, y el porcentaje de fruto afectado se limita de 0.83 a 4% de frutos. En esta zona cabe destacar que no se han localizado picada muerta, y las que han evolucionado están en todos los estados, aunque minoritariamente en L2 y L3.

En Borja la captura está en los 4 adultos por día y los daños están en 7.5% de los frutos todas las encontradas en forma de pupas y puparios.

En Zaragoza 27 de septiembre de 2021